

149 Polluela bastarda

Pon tu logo aquí

POLLUELA BASTARDA (*Zapornia parva*)

IDENTIFICACIÓN

18-20 cm. **Macho** con partes superiores pardo oliva rayadas de pardo y negro y con dos listas laterales de machas blancas; cara y partes inferiores gris azulado; flancos traseros e infracoberteras de la cola gris con barreado negro; pico verde con mancha roja en la base. **Hembra** con partes superiores como el **macho**; garganta blanca; partes inferiores amarillo ocre; flancos pardos barreados de gris y blanco; pico verde con mancha roja en la base.

ESPECIES SIMILARES

El **rascón europeo** tiene un pico largo y rojizo. Los **juveniles** y **adultos** de **polluela pintoja** tienen moteado blanco en la cabeza, pecho y nuca. El **adulto** de **polluela chica** no tiene mancha roja en la base del pico, tiene una amplia zona barreada en los flancos y calzas y bien marcado punteado blanco en las coberteras del ala; los **juveniles** tienen moteado negro en el capirote y pecho más barreado.



Rascón europeo

SEXO

Macho con partes inferiores, garganta y cuello gris pizarra. **Hembra** con partes inferiores de color marrón ante a rosado; garganta y cuello blanco sucio.

Los **juveniles** no pueden sexarse utilizando el diseño del plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con partes inferiores blanco sucio, con moteado marrón; ceja marrón; terciarias y coberteras del ala con moteado blanco; iris gris marrón; pico verde claro.

2º año similar al **adulto**, pero **hembra** con vientre ante más pálido y menos salmón; **macho** con tinte marrón en el vientre gris; ambos sexos tienen retenidas las plumas de vuelo, coberteras del ala y álula **juveniles**, que estarán más gastadas que en los **adultos**; el moteado blanco de las plumas **juveniles** retenidas ha desaparecido por el desgaste, existiendo si acaso algunos bordes blancos en algunas plumas.

Adultos con el plumaje descrito en **SEXO**; con partes inferiores sin blanco sucio ni moteado marrón; sin ceja marrón; terciarias y coberteras del ala de color uniforme, sin moteado blanco; iris rojizo; pico verde intenso.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, con aves que la terminan antes de la migración y otros que la suspenden y terminan en sus zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo, coberteras del ala y terciarias; algunas aves comienzan la muda en las zonas de cría y otras esperan a llegar a sus áreas de invernada **CUIDADO**: han sido descritos ejemplares **juveniles** que tienen una muda completa. La muda **prenupcial** es poco conocida, abarcando probablemente sólo plumas corporales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Estatus poco conocido. Existe la posibilidad de su reproducción en las Cinco Villas, siendo más frecuente en los pasos.