

150 Polluela chica

Pon tu logo aquí

POLLUELA CHICA (*Zapornia pusilla*)

IDENTIFICACIÓN

16-19 cm. Partes superiores pardo rojizo, estriado de negro y con machas blancas; frente gris azulada; alas pardo negruzcas, con pintas blancas en las coberteras y escapulares; garganta gris claro; partes inferiores gris pizarra; flanco e infracoberteras caudales barreadas de negro y blanco; pico verde.

ESPECIES SIMILARES

El **rascón europeo** tiene un pico largo y rojizo. Los **juveniles** y **adultos** de **polluela pintoja** tienen moteado blanco en la cabeza, pecho y nuca. El **adulto** de **polluela bastarda** tiene una macha roja en la base del pico y carece de una amplia zona barreada en los flancos y calzas y de un bien marcado punteado blanco en las coberteras del ala; los **juveniles** no tienen moteado negro en el capirote y el pecho está menos barreado.



Rascón europeo

SEXO

Plumaje muy similar en ambos sexos; muchos ejemplares, pero no todos, se pueden sexar por el color del mentón, que es gris como el resto de las partes inferiores en el **macho** y más claro que el resto de las partes inferiores en la **hembra**. Los **juveniles** no pueden sexarse utilizando el diseño del plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con las estrías en las partes superiores redondeadas y cortas; partes inferiores blanco sucio con moteado marrón; flancos e infracoberteras de la cola con barreado marrón y blanco; garganta blanco sucio; mejillas y lados de cuello blanco sucio con moteado marrón; iris verde oliva; pico marrón claro.

2º año similar al **adulto**, pero habiendo retenido las plumas de vuelo, coberteras del ala y álula **juveniles**, que estarán más gastadas que en los **adultos**; algunos ejemplares pueden todavía mantener cierta cantidad de plumas marrones en el área auricular.

Adultos con las estrías en las partes superiores alargadas; partes inferiores grises sin moteado marrón; flancos e infracoberteras de la cola con barreado negro y blanco; garganta gris; mejillas y lados de cuello grises; iris rojizo; pico verde.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, con aves que la terminan antes de la migración y otros que la comienzan en sus zonas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo y cola; algunas aves comienzan la muda en las zonas de cría y otras esperan a llegar a sus áreas de invernada. La muda **prenupcial** es poco conocida, abarcando probablemente sólo plumas corporales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Estatus poco conocido. Existe la posibilidad de su reproducción en las Cinco Villas, siendo más frecuente en los pasos.