

396 Treparriscos

Pon tu logo aquí

TREPARRISCOS (*Tichodroma muraria*)

IDENTIFICACIÓN

16-17 cm. Partes superiores grises; coberteras y plumas de vuelo de color rojo; cola negra con punta gris; partes inferiores grises o negras en **macho** nupcial; pico fino y largo.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

En plumaje nupcial, **macho** con mentón, garganta y parte superior del pecho de color negro; **hembra** con mentón, garganta y parte superior del pecho blancuzcos, si acaso algunos ejemplares con una macha negra rodeada de banco-gris. Después de la muda **postnupcial** ambos sexos son de aspecto similar.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juveniles de aspecto similar a los adultos, si acaso con el color gris más pálido; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera muy difícil de distinguir de los adultos; algunos ejemplares pueden reconocerse por el mayor desgaste de las plumas de vuelo y grandes coberteras y coberteras primarias **juveniles** no mudadas.

Adultos con las plumas desgastadas en verano.

MUDA

Muda **postnupcial** completa que suele estar terminada a mitad de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando las plumas del cuerpo y las pequeñas y medianas coberteras; está terminada a finales de septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial**, entre febrero y abril, cambiando plumas corporales para adquirir el plumaje nupcial.



Treparriscos. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, con movimientos en invierno hacia zonas más bajas. Nidifica en roquedos de la Cordillera Pirenaica.