

# 402 Alcaudón chico

Pon tu logo aquí



Alcaudón chico. Verano. Hembra (11-VII).



Alcaudón real



## ALCAUDÓN CHICO (*Lanius minor*)

### IDENTIFICACIÓN

19-21 cm. Dorso gris; partes inferiores con tinte rosado; cabeza gris, con antifaz negro que sube sobre la frente; ala oscura con mancha blanca en la base de las primarias.




### SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con mancha de la frente de color negro azabache; **hembra** con mancha de la frente de color negro con plumas grises. Los **juveniles** no se pueden sexar.

**CUIDADO:** en otoño, después de la muda **postnupcial**, hay **machos** con mancha de la frente de color gris y **hembras** sin nada de negro.




Alcaudón chico. Diseño del ala, cabeza y frente.



### ESPECIES SIMILARES

El **alcaudón real** tiene un aspecto muy parecido pero es de tamaño mayor, la mancha blanca del ala es menos extensa, tiene una ceja blanca y carece de mancha negra sobre la frente.



Alcaudón chico. Verano. Determinación del sexo. Diseño de la frente: izquierda macho; derecha hembra.

# 402 Alcaudón chico

Pon tu logo aquí


## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juveniles** con plumaje nuevo; partes superiores grises barreadas de gris oscuro; frente de color gris.

**1º año** con plumas de vuelo nuevas; aspecto como los juveniles, pero sin plumas barreadas de gris.

**Adultos** con plumaje desgastado; partes superiores gris uniforme; frente de color negro.



Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño de la frente: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Alcaudón chico. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

## MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** parciales, abarcando plumas corporales y algunas coberturas del ala antes de la migración, en las zonas de cría. Ambos tipos de edad tienen una muda **pre-nupcial** completa en las áreas de invernada.

## FENOLOGÍA


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival. Nidificante muy escaso y localizado en el oriente de la provincia de Huesca.



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño de la cabeza (11-VII).



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño de la mancha de la frente (11-VII).

## 402 Alcaudón chico

Pon tu logo aquí



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño del pecho (11-VII).



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño del dorso (11-VII).



Alcaudón chico. Verano. Hembra: diseño del ala (11-VII).