

Turdus iliacus
Redwing
Zorzal alirrojo

MOULT

Complete **postbreeding** moult, usually finished late September. Partial **postjuvenile** moult including body feathers, lesser and median wing coverts and inner greater coverts; some birds can moult all greater coverts and some tertials; usually finished in September before migration.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que termina habitualmente a finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras del ala y las grandes coberteras más internas; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes coberteras y algunas terciarias; suele estar terminada en septiembre, antes de la migración.

SEXING

Plumage of both sexes alike.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar.

AGEING

This species doesn't breed in Aragón, so only 2 types of age can be recognized:

1st year autumn/2nd year spring with moult limit between inner moulted greater covers (without pale spots on tips and longer) and **juvenile** retained (with pale spots on tips); tertials, if unmoulted, with a pale triangular spot on tips; tail feathers with pointed tips.


Adult without moult limit on wing coverts; greater coverts with the same length and with the pale spot on the tip with similar shape; tertials without pale spot or, if there is, without triangular shape; tail feathers with rounded tips.

EDAD

Esta especie no nidifica en Aragón, por lo que pueden reconocerse sólo 2 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras internas mudadas (sin mancha clara en la punta y más largas) y las **juveniles** retenidas (con mancha clara en la punta); terciarias, si no han sido cambiadas, con mancha clara de forma triangular en la punta; plumas de la cola puntiagudas.


Adulto con las plumas del ala de la misma generación; grandes coberteras de la misma longitud y con la mancha clara de la punta similar; terciarias sin mancha clara o, si la hay, sin forma triangular; plu-



Ageing. Adult. Tail pattern: feathers with rounded tips (1).
 Edad. Adulto. Diseño de la cola: plumas con puntas redondeadas (1).



Ageing. 1st year autumn. Tail pattern: feathers with pointed tips (1).
 Edad. 1º año otoño. Diseño de la cola: plumas con puntas agudas (1).




Ageing. Adult. Wing pattern: wing with one age of feathers; greater coverts without



traingular pale spots (1); tertials without pale spots on tips (2) or with pale spots without triangular shape (3) (05-XII).

Edad. Adulto. Diseño del ala: ala con una generación de plumas; grandes coberteras sin punta clara de forma triangular (1); terciarias

sin punta clara (2) o con mancha clara en la punta sin forma triangular (3) (05-XII).



Ageing. 1st year autumn. Wing pattern: wing with two ages of feathers



(no. 1 points the moult limit); lesser, median and inner greater coverts without pale spots and longer, postjuvenile; outer greater coverts shorter and with triangular pale spots and rest of the wing feathers, juvenile; tertials with pale spots on tips with triangular shape (2) (01-XI).

Edad. 1º año otoño. Diseño del ala: ala con dos generaciones de plumas (el nº 1 señala el límite de muda); pequeñas, medianas y grandes coberteras internas sin mancha clara y más largas, postjuveniles; grandes coberteras externas más cortas y con punta clara con forma triangular y resto de las plumas del ala, juveniles; terciarias con mancha clara en la punta con forma triangular (2) (01-XI).