

**IDENTIFICATION KEY: *Phylloscopus* WARBLERS.**

**CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MOSQUITEROS (GÉNERO *Phylloscopus*).**

1 - 10th primary shorter than primary coverts; with distinct contrast between yellow throat and pure white belly: Wood Warbler (*Phylloscopus sibilatrix*)

*10ª primaria más corta que las coberteras primarias; con contraste claro entre la garganta amarilla y el vientre blanco puro: mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix)*

- 10th primary longer than primary coverts; with other underparts pattern.

*10ª primaria más larga que las coberteras primarias; con otro diseño de las partes inferiores.... 2*

2 - Pure white underparts; yellowish rump that contrasts sharply with the grey back: Western Bonelli's Warbler (*Phylloscopus bonelli*)

*Partes inferiores blanco puro; obispillo amarillento que contrasta nítidamente con el dorso gris: mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)*

- Underparts yellowish, brown-yellow or off-white; yellow-olive rump

*Partes inferiores amarillentas, pardo-amarillas o blanco sucio ..... 3*

3 - Emarginated to 6th primary; usually pale legs; on wing, 7th and 8th primaries have the same length: Willow Warbler (*Phylloscopus trochilus*)

*Generalmente con patas claras; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud; con emarginación hasta la 6ª primaria: mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)*

- Emarginated to 5th primary



*Emarginación hasta la 5ª primaria ... 4*

4 - Brown olive upperparts, with brownish tinge; breast with yellow and rufous tinge; ear coverts and neck with brown-greyish tinge; rump more yellow than back; on wing, 6th, 7th and 8th primaries have the same length, 9th primary has the same length than 3rd or between 3rd and 4th; emargination to 5th primary: Chiffchaff (*Phylloscopus collybita*)

*Partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón; pecho con tonos ocreos y amarillos; zona auricular y cuello de tonos marrón-grisáceos; obispillo algo más amarillo que el dorso; en el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª; con emarginación hasta la 5ª primaria: mosquitero común (Phylloscopus collybita)*




- Green upperparts; white breast with yellow streaks; pale ear coverts streaked yellow; back and rump with the same greenish tinge; on wing, 7th and 8th primaries have the same length, 9th primary has the same length than 4th or between 3rd and 4th or between 4th and 5th, emargination to 5th primary: Iberian Chiffchaff (*Phylloscopus ibericus*)

*Partes superiores verde brillante; pecho blanco estriado de amarillo; zona auricular clara con estrías amarillas; dorso y obispillo con la misma tonalidad verdosa; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª; con emarginación hasta la 5ª primaria: mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus).*





Wood Warbler: 10th primary shorter than primary coverts (1); distinct contrast between yellow throat and pure white belly (2).

*Mosquitero silbador: 10ª primaria más corta que las coberteras primarias (1); con contraste bien marcado entre la garganta amarilla y el vientre blanco puro (2).*





Western Bonelli's Warbler: 10th primary longer than primary coverts (1); pure white underparts (2); yellowish rump that contrasts sharply with the grey back (3).

*Mosquitero papialbo: 10ª primaria más larga que las coberteras primarias (1); partes inferiores blanco puro (2); obispillo amarillento que contrasta nítidamente con el dorso gris (3).*



Willow Warbler: 10th primary longer than primary coverts (1); pale legs (2); rump with the same colour than back (3); 7th and 8th primaries with the same length (4); emarginated to 6th primary (5).

*Mosquitero musical: 10ª primaria más larga que las coberteras primarias (1); patas claras (2); obispillo del mismo color que el dorso (3); 7ª y 8ª primarias con la misma longitud (4); con emarginación hasta la 6ª primaria (5).*




Chiffchaff:  
brown  
olive up-  
perparts,  
with brow-  
nish tinge  
(1); breast  
with ye-  
llow and  
rufous tinge (2); ear coverts with  
brown-greyish tinge (3); rump  
more yellow than back (4); on  
wing, 6th, 7th and 8th primaries  
have the same length (5), 9th  
primary has the same length than  
3rd or between 3rd and 4th (6);  
emargination to 5th primary (7).

*Mosquitero común:* partes supe-  
riores pardo oliváceas, teñidas  
de marrón (1); pecho con tonos  
ocres y amarillos (2); zona auri-  
cular y cuello de tonos marrones  
-grisáceos (3); obispillo algo  
más amarillo que el dorso (4);  
en el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias  
tienen la misma longitud (5), la 9ª primaria es igual  
a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª (6); emarginación hasta  
la 5ª primaria (7).




*Mosquitero común:* partes supe-  
riores pardo oliváceas, teñidas  
de marrón (1); pecho con tonos  
ocres y amarillos (2); zona auri-  
cular y cuello de tonos marrones  
-grisáceos (3); obispillo algo  
más amarillo que el dorso (4);  
en el ala, la 6ª, 7ª y 8ª primarias  
tienen la misma longitud (5), la 9ª primaria es igual  
a la 3ª o entre la 3ª y la 4ª (6); emarginación hasta  
la 5ª primaria (7).



Iberian  
Chiffchaff:  
green up-  
perparts  
(1); white  
breast with  
yellow  
streaks (2);  
ear coverts  
pale streaked yellow (3); back  
and rump with the same ye-  
llow tinge (4); on wing, 7th  
and 8th primaries have the  
same length, 9th primary has  
the same length than 4th or  
between 3rd and 4th or be-  
tween 4th and 5th (5); emar-  
gination to 5th primary (6).

*Mosquitero ibérico:* partes  
superiores verdosas (1); pe-  
cho blanco estriado de amari-  
llo (2); zona auricular clara  
con estriás amarillas (3); dor-  
so y obispillo con la misma  
tonalidad verdosa (4); en el  
ala, la 7ª y 8ª primarias tienen  
la misma longitud, la 9ª pri-  
maria es igual que la 4ª, o  
entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª (5); emarginación hasta la 5ª primaria ((6).



*Mosquitero ibérico:* partes  
superiores verdosas (1); pe-  
cho blanco estriado de amari-  
llo (2); zona auricular clara  
con estriás amarillas (3); dor-  
so y obispillo con la misma  
tonalidad verdosa (4); en el  
ala, la 7ª y 8ª primarias tienen  
la misma longitud, la 9ª pri-  
maria es igual que la 4ª, o  
entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª (5); emarginación hasta la 5ª primaria ((6).