

**IDENTIFICATION OF MOUSTACHED WARBLER (*Acrocephalus melanopogon*), AQUATIC WARBLER (*Acrocephalus paludicola*) AND SEDGE WARBLER (*Acrocephalus schoenobaenus*)**


**IDENTIFICACIÓN DE CARRICERÍN REAL (*Acrocephalus melanopogon*), CARRICERÍN CEJUDO (*Acrocephalus paludicola*) Y CARRICERÍN COMÚN (*Acrocephalus schoenobaenus*)**

**ALL AGES**

At **any age** can be separated by head and rump pattern and primary projection.


**CUALQUIER EDAD**

En **cualquier edad** pueden ser separados por el diseño de la cabeza y obispillo y la proyección de primarias.






Aquatic Warbler: pale creamy throat (1); creamy supercilium (2); without dark lores (3); crown with a pale line in the centre (4); streaked rump (5); short primary projection (6).

*Carricerín cejudo*: garganta crema claro (1); ceja cremosa (2); sin brida oscura (3); pileo con una línea clara en el centro (4); obispillo con estrías (5); proyección primaria corta (6).



Moustached Warbler: whitish throat /1); pure white and wide supercilium (2); blackish lores (3); crown unstreaked blackish (4); unstreaked rump (5); short primary projection (6).

*Carricerín real*: garganta blanca (1); ceja blanco puro y ancha (2); brida negra (3); pileo negro uniforme (4); obispillo sin estrías (5); proyección primaria corta (6).



Sedge Warbler: pale creamy throat (1); creamy supercilium (2); brownish lores (3); crown streaked dark (4); unstreaked rump (5); long primary projection (6).

*Carricerín común*: garganta crema claro (1); ceja cremosa (2); brida marrón (3); pileo con estrías oscuras (4); obispillo sin estrías (5); proyección primaria larga (6).