

IDENTIFICATION OF CETTI'S WARBLER (*Cettia cetti*), SAVI'S WARBLER (*Locustella luscinioides*) AND EURASIAN REED WARBLER (*Acrocephalus scirpaceus*)



IDENTIFICACIÓN DE CETIA RUISEÑOR (*Cettia cetti*), BUSCARLA UNICOLOR (*Locustella luscinioides*) Y CARRICERO COMÚN (*Acrocephalus scirpaceus*)

ALL AGES

At any age can be separated by tail pattern and bristles near the base of bill.



CUALQUIER EDAD

En cualquier edad pueden ser separadas por el diseño de la cola y las cerdas de la comisura del pico.




Cetti's Warbler: with bristles near the base of bill (1); rounded tail with ten feathers.

Cetia ruiñeñor: con cerdas en la comisura del pico (1); cola redondeada con diez plumas.



Savi's Warbler: without bristles near the base of bill (1); rounded tail with twelve feathers.

Buscarla unicolor: sin cerdas en la comisura del pico (1); cola redondeada con doce plumas.



Eurasian Reed Warbler: with bristles near the base of bill (1); squared tail with twelve feathers.

Carricero comùn: con cerdas en la comisura del pico (1);

cola cuadrada con doce plumas.